(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年5月6日(06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/039621 A1

(51) 国際特許分類7:

A61K 38/19,

A61P 9/00, 9/10, 17/02, 43/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016290

(22) 国際出願日:

2004年10月27日(27.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-366480

> 2003年10月27日(27.10.2003) 2004年2月13日(13.02.2004) 特願2004-036613

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 学校法 人慶應義塾 (KEIO UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒1088345 東京都港区三田二丁目 15番 45号 Tokyo (JP). 中 外製薬株式会社 (CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1158543 東京都北区浮間 5 丁目 5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福田 恵一 (FUKUDA, Keilchi) [JP/JP]; 〒1608582 東京都新宿区 信濃町35番地 学校法人慶應義塾内 Tokyo (JP). 藤田 淳 (FUJITA, Jun) [JP/JP]; 〒1608582 東京都新宿区信 濃町35番地 学校法人慶應義塾内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 社本 一夫, 外(SHAMOTO, Ichio et al.); 〒 1000004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号新大 手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FIBROBLAST-MOBILIZING AGENT CONTAINING G-CSF AND WOUND REMEDY

(54) 発明の名称: G-CSFを含む線維芽細胞動員剤及び創傷治療剤

(57) Abstract: It is intended to conveniently mobilize fibroblasts toward a wound tissue, without fibroblast transplantation, and engraft the fibroblasts in the wound tissue, thereby treating the wound. By administering G-CSF, fibroblasts are transported into a myocardial infarction lesion. Thus, cardiac depression is prevented and cardiac remodeling is improved.

2005/039621 (57) 要約: 本発明は、線維芽細胞を移植することなく、簡便に線維芽細胞を創傷組織に動員し、線維芽細胞を創 傷組織に生着させ、そして創傷を治療することを目的とする。G-CSFを投与することにより、心筋梗塞巣に線 維芽細胞が移動し、心機能の低下が防止され、心臓のリモデリングを改善する。

